

ふるさと稲作ほっとLINE NO.3

これから使用する「苗箱処理剤」の登録内容や使用方法を紹介します。
 薬剤によって、床土に混和できないものがありますので、使用の際は登録内容を確認して使用をお願いします。
 使用方法の誤認によって、苗のトラブルが毎年発生しています。

水稲用箱施用剤登録内容一覧

適用病害虫	成分数	主要適用病害				主要適用害虫						側条施用	登録使用量 (箱当たり) 稚苗・中苗	密苗 (高密度播種) の場合 (箱当たり)	箱処理剤使用時期	
		いもち病	もみ枯前 (は種前、菌病 (苗腐敗症) 床土混和)	もみ枯時、 覆土前 (苗腐敗症)	紋枯病	イネドロオイムシ	イネミズゾウムシ	フタオビコヤガ (アオムシ)	ニカメイチュウ	イナゴ類	カメムシ類					
土壌混和 (可能)	ファーストオリゼパディート箱粒剤	2	○	×	×		○	○	○	○	○	×	×	50g	100g まで	は種前～ は種時
	ルーチンアドスピノ箱粒剤	2	○	×	○		○	○	○	○	×	×	×	50g		は種前～ 移植当日
	ルーチンパンチ箱粒剤	2	○	○	○		○	○	○	○	○	×	○	50g	100g まで	は種前～ 移植当日
	ヨーバルトップ箱粒剤	2	○	○	○		○	○	○	○	×	×	×	50～ 75g	100g まで	は種前～ 移植当日
	ツインターボ箱粒剤	2	○	○	○		○	○	×	×	×	×	○	50g	100g まで	は種前～ 移植当日
	ファーストオリゼフェルテラ箱粒剤	2	○	×	×		○	○	○	○	×	×	×	50g	100g まで	は種前～ は種時
土壌混和 (不可)	デジタルミネクト箱粒剤	2	○	×	×		○	○	○	○	○	×	○	50g	100g まで	移植3日前～ 移植当日
	Dr.オリゼパディート箱粒剤	2	○	×	×		○	○	○	○	○	×	○	50g	100g まで	緑化期～ 移植当日
	ルーチンブライト箱粒剤	3	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	50g		移植3日前～ 移植当日
	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤	2	○	×	×		○	○	×	○	×	×	○	50g	100g まで	移植3日前～ 移植当日
	デジタルメガフレア箱粒剤	2	○	×	×		○	○	×	○	×	○	○	50g	100g まで	移植3日前～ 移植当日
	Dr.オリゼフェルテラ箱粒剤	2	○	×	×		○	○	○	○	×	×	○	50g	100g まで	緑化期～ 移植当日

登録内容の詳細や特徴につきましては、最寄りの営農センターまたは米穀課 専任指導までご相談ください。